



1. Referentie

Referentie	Randolph, K., Russell, D., Harker Tillman, K. & Fincham, F. (2010). Protective influences on the negative consequences of drinking among youth. <i>Youth and Society</i> , 41, (1), 546-568.
Taal	Engels
ISBN - ISSN	/
Publicatievorm	Tijdschriftartikel

2. Abstract

De preventie van alcoholgebruik bij minderjarigen richt zich vooral op het versterken van beschermende factoren. Op basis van data van de 'Nationale Longitudinale studie van de Gezondheid van Adolescenten' onderzoeken de auteurs de effecten van beschermende factoren op drie domeinen van het leven van adolescenten (individueel, gezin en extrafamiliaal) op de ervaring van negatieve gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren die reeds alcohol drinken. Deze negatieve gevolgen hadden betrekking op de relatie met ouders, vrienden en partners en bovendien ook op ervaringen als vechten, zich ziek voelen en zich gedragen op manieren waarvan men achteraf spijt heeft. Hierbij werd ook stevast gecontroleerd voor relevante risicofactoren. De resultaten hiervan worden in deze bijdrage verder beschreven.

3. Trefwoorden

Thema('s)	Welzijn en gezondheid
Trefwoord(en)	Alcohol, levensloop

4. Onderzoeker

Opdrachtgever	/
Onderzoeker(s)	Karen Randolph, David Russel, Kathryn Harker Tillman & Frank Fincham Florida State University

5. Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag	Wat zijn de effecten van een aantal beschermende factoren op individueel, familiaal en extrafamiliaal vlak op de negatieve effecten van alcoholgebruik bij adolescenten?
Hypothesen	/

6. Methode

Onderzoeksmethode	Nationale representatieve steekproef samengesteld aan de hand van een multistage, cluster sampling design op basis van scholen. In de eerste wave (1994-95) werden face to face interviews afgenomen bij 20.745 respondenten, in de tweede wave (1996) werden gelijkaardige follow up interviews gedaan bij 14.736 van deze respondenten.
Onderzochte groep	Enkel die respondenten uit de studie die aangaven dat ze het afgelopen jaar alcohol hadden gedronken werden opgenomen. In totaal bestond de steekproef uit 3862 jongeren. 48%

	hiervan was man, 52% waren vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 16.3 jaar. De meeste respondenten beschreven zich als blank (63%); 15% omschreef zich als Spaans, 13% als zwart en 3% als 'Native American'. De meeste respondenten (60%) gaf aan niet meer dan één keer per maand alcohol te drinken.
Bereik	Verenigde Staten

7. Resultaten

Veranderingen in negatieve gevolgen	Uit deze cijfers blijkt dat jongeren die drinken niet progressief meer negatieve gevolgen rapporteren. De overgrote meerderheid rapporteerde geen tot weinig negatieve gevolgen; een kleine groep echter lijkt wel ernstige gevolgen te ondervinden (49 respondenten rapporteerden meer dan 21 negatieve gevolgen in het voorbije jaar).
Cross-sectionele resultaten	Alle drie de risicofactoren (alcoholgebruik bij vrienden, drinkfrequentie en gemiddeld aantal consumpties per keer) bleken sterke voorspellers van negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Enkel de aanwezigheid van alcohol in huis bleek geen invloed te hebben op de mate waarin respondenten negatieve gevolgen rapporteerden. Opvallend is dat deze effecten sterk blijven telkens wanneer de drie verschillende groepen van beschermende factoren toegevoegd worden. Bovendien hebben deze beschermende slechts weinig effect op de mate waarin negatieve gevolgen ervaren worden. Enkel één individuele factor, beslissingen maken, blijkt een significant effect uit te oefenen.
Longitudinale effecten	De frequentie van drinken bij de eerste wave blijkt een belangrijke voorspeller van negatieve gevolgen in de tweede wave. Ook de mate van negatieve gevolgen in de eerste afname is sterk gerelateerd aan de aanwezigheid van negatieve gevolgen in de tweede afname. Opvallend is wel dat alcoholgebruik door peers en het gemiddelde aantal consumpties in de eerste wave geen voorspeller zijn van negatieve gevolgen in de tweede wave. Het effect van beschermende factoren lijkt daarentegen verandert wel doorheen de tijd. Geen enkele van de individuele en extrafamiliale variabelen blijft overeind in dit longitudinale model. Wat familiale factoren betreft daarentegen blijkt dat een hogere niveaus van hechting aan de moeder in de eerste wave de kans op negatieve gevolgen in de tweede wave verminderen (hoewel dit effect niet echt sterk is)

8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek

/